

Mindre almindelige fugle på Amager

1958 – 1968

Stig Kjærgaard Rasmussen

Mindre almindelige fugle på Amager gennem årene 1958-1968.

Nedenfor er givet en samlet fremstilling af en række mindre almindelige fuglearters forekomst på Amager i årene 1958-1968. De omtalte fugle tilhører arter, der træffes fåtalligt i området, men som ikke er så sjældne, at iagttagelserne skal behandles af D.O.F.s sjældenhedsudvalg. Iagttagelserne er fortrinsvis fra det sydlige Amager, d.v.s. Kongelunds-området og Aflandshage og i mindre omfang fra området omkring den nuværende Sjællandsbro. Hertil kommer enkelte observationer fra andre steder på Amager.

Oversigten er udarbejdet dels på grundlag af alle tidligere i D.O.F.T. og Feltornithologen offentliggjorte iagttagelser - her kan først og fremmest nævnes den i D.O.F.T., årg. 59, 1965 offentliggjorte liste omhandlende mindre almindelige fugle truffet på Sydvestamager i årene 1960-63 - og dels på grundlag af ikke tidligere offentliggjorte observationer foretaget af følgende ornithologer: Steen J. Christensen, H. P. Jensen, Stig Kjærgaard Rasmussen, Johnny L. Pedersen, Svend Pedersen og John Sandberg.

Blisgås (Anser albifrons).

Kun 13 iagttagelser af ialt 40 - hovedsageligt trækkende fugle - heraf sås 12 i vintermånederne jan./febr., 12 om foråret ult. marts/ med. april og 16 om efteråret ult. sept./med. okt.

Bræmgås (Branta leucopsis).

Fra perioden med. marts/ult. maj foreligger 9 iagttagelser af ialt 761 fugle, heraf 737 ult. marts/ult. april. Om efteråret er arten kun observeret 2 gange, idet ialt 4 er set ult. okt./pr. nov. Endelig rastede 1 i Dragør i dec. 1961 og jan. 1962 (D.O.F.T., årg. 59, 1965).

Pibesvane (Cygnus columbianus).

Er truffet regelmæssigt men i vekslende antal i træktiderne. Om foråret er ialt set 274 fra d. 18. marts til d. 8. maj fordelt med 3 med. marts, 47 ult. marts, 46 pr. april, 63 med. april, 114 ult. april og 1 pr. maj. Om efteråret er ialt observeret 417 fra d. 8. okt. til d. 19. nov. fordelt med 104 pr. okt., 196 med. okt., 78 ult. okt., 38 pr. nov. og 1 med. nov. Endelig foreligger en iagttagelse af 1 rst. ved Aflandshage d. 24. dec. 1962 (FO 1/1967).

Duehøg (Accipiter gentilis).

1 truffet rst. i Kongelunds-området således: 16.-17. febr. 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 1965), d. 27. febr. 1965 samt 4. jan.- 30. marts 1964 (FO 2/1966). 5 trækiagttagelser fordelt med 1 pr: april, 2 sept., 1 ult. nov. og 1 pr. dec.

Rød Glente (Milvus milvus).

Fortrinsvis set om foråret. Ialt 18 iagttaget, heraf 1 med. marts, 3 ult. marts, 3 pr. april, 6 med. april (alle 1963), 1 pr. maj, 1 med. juni, 1 ult. juli og 2 pr. sept.

Havørn (Haliaeetus albicilla).

3 trækiagttagelser: 1 juv. d. 18. okt. 1964 (FO 2/1966), 1 juv. d. 11. marts 1966 (FO 2/1966) og 1 juv. d. 20. marts 1966 (FO 2/1966). Følgende vinterobservationer foreligger: 1 juv. rst. d. 30. nov. 1958, 1-3 juv. rst. ult. jan./febr. 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 1965), 1 juv. rst. d. 10. marts 1965 (FO 2/1966), 1 juv. rst. pr. dec. 1965 - pr. febr. 1966 (FO 2/1967).

Hedeheg (Circus pygargus).

1 juv. rst. Det Inddæmmede Areal d. 24.- 31. aug. 1959 og 1 juv. rst. sammesteds juli/aug. 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 1965). Herudover 3 iagttagelser fra maj (heraf 1 ad. han) og 2 fra aug. (hunner el. juv.).

Fiskeørn (Pandion haliaetus).

Regelmæssig på træk såvel forår som efterår. I årene 1958-1968 er ialt iagttaget 108 om foråret fra d. 20. marts til d. 24. maj fordelt med 1 med. marts, 3 ult. marts, 33 pr. april, 28 med. april, 27 ult. april, 6 pr. maj, 8 med. maj og 2 ult. maj. I samme årrække er 80 set om efteråret fra d. 3. aug. til d. 18. okt. fordelt med 6 pr. aug., 13 med. aug., 22 ult. aug., 16 pr. sept., 18 med. sept., 2 ult. sept. og 3 med. okt. Endvidere er 3 truffet i juli.

Lærkefalk (Falco subbuteo).

Regelmæssig men fåtallig på træk, hyppigst om efteråret. Ialt 14 set om foråret fra d. 18. april til d. 16. juni fordelt med 4 i april, 8 i maj og 2 i juni samt 32-36 om efteråret fra d. 18. aug. til d. 17. okt. fordelt med 6-7 i aug., 25-28 i sept. og 1 i okt.

Vandrefalk (Falco peregrinus).

I første del af perioden fåtallig, men regelmæssig på træk og om vinteren, men efter 1964 kun 1 iagttagelse: 1 trk. Kongelunden d. 4. okt. 1967 (FO 3/1968). I årene 1958-1964 ialt set 25 heraf 1 i jan., 2 i febr., 2 i marts, 1 i maj, 8 i aug., 4 i sept., 5 i okt. og 2 i nov.

Trane (Grus grus).

Optræder regelmæssigt men i stærkt vekslende antal i træktiderne og lejlighedsvis som sommergæst. I årene 1958-1968 er ialt observeret ca. 850 om foråret i perioden fra d. 30. marts til d. 20. maj fordelt med 4 i marts, ca. 805 i april (heraf alene ca. 635 i 1963) og 41 i maj samt 74 om efteråret fra d. 13. aug. til d. 16. okt. fordelt med 8 i aug., 26 i sept. og 40 i okt.; desuden er ca. 40 truffet i juli.

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana).

1963: 1 rst. d. 12. maj Kongelundsstranden (D.O.F.T., årg. 59, 1965). 1967: 1 rst. d. 14.-18. april Kongelundsstranden; 1 rst. d. 31. aug. Sjællandsbroen (D.O.F.T., årg. 63, 1969).

Lille Præstekrave (Charadrius dubius).

Set næsten årligt i få eksemplarer fra pr. maj til ult. okt. Ialt ca. 30 iagttagelser, hvoraf hovedparten i juli og aug. Højeste antal iagttagne fugle pr. dag er 4.

Hvidbrystet Præstekrave (Charadrius alexandrinus).

Yderst fåtallig og ikke årlig. 10-15 iagttagelser af omkring 15 fugle i perioden fra pr. april til med. aug.

Stor Kobbersnepe (Limosa limosa).

Optræder hvert år fåtalligt trækkende og rastende. Observationerne er fra d. 28. marts til d. 14. aug., og ialt er set 55-62 fugle fordelt over de enkelte måneder på følgende måde: 1 ult. marts, 17-21 april (heraf 14-16 med. april), 9-10 maj, 2 ult. juni, 19-21 juli og 7 aug. Det største antal sås d. 20. april 1966, hvor 7 rst. Kongelundsstranden. I 1967 rst. 1-6 i en længere periode fra d. 14. juli til d. 14. aug. Kongelundsstranden og Aflandshage.

Sortgrå Ryle (Calidris maritima).

1959: 5 rst. d. 1. marts Aflandshage.

1960: 1-2 set 4 gange d. 31. jan. - 20. marts Kongelundsstranden og Aflandshage (D.O.F.T., årg. 59, 1965).

1966: 1 set jævnlgt d. 22. jan. - 20. marts Kongelundsstranden; 1 rst. d. 13. - 15. okt. Kongelundsstranden.

Sandleber (Crocethia alba).

7 iagttaget om foråret ved Kongelundsstranden: 2 ult. marts, 1 med. maj, 2 ult. maj, 1 pr. juni og 1 med. juni. Truffet regelmæssigt fra d. 16. juli til d. 23. sept., ialt set 73-105 hvoraf 1 med. juli, 15-25 ult. juli, 30-50 pr. aug., 8-10 med. aug., 4 pr. sept., 5 med. sept. og 4 ult. sept. Maksimale antal rastende fugle 7 sås i en periode ult. juli og pr. aug. 1965.

Kærleber (Limicola falcinellus).

4 forårsiagttagelser fra Sjællandsbroen: 2 rst. d. 16. maj 1959, 1 rst. d. 23. maj 1959, 1 rst. d. 17. maj 1961 og 3 rst. d. 24. maj 1961. 47 iagttagelser af 84-111 fugle i perioden fra d. 13. juli til d. 1. sept. fordelt på følgende måde: 20-30 med. juli, 9-11 ult. juli, 16-19 pr. aug., 27-34 med. aug., 11-16 ult. aug. og 1 pr. sept. Største antal på en enkelt dag 11 set d. 9. aug. 1968 Aflandshage.

Odinshane (Phalaropus lobatus).

3 iagttagelser fra maj/juni: 1 rst. d. 20. maj 1968 og d. 23. juni 1968 Kongelundsstranden (FO 3/1968) samt 1 rst. d. 5. juni 1959 Sjællandsbroen. I øvrigt 6-8 set i perioden fra d. 6. aug. til d. 31. aug.

Alm. Kjove. (Stercorarius parasiticus).

1-4 fugle set næsten årligt. Ialt er truffet 21-22 fordelt på følgende måde: 2 pr. juli, 4 med. juli, 6-7 ult. juli, 4 ult. aug., 2 med. sept., 1 pr. okt., 1 pr. nov. samt 1 pr. dec.

Dværgmåge (Larus minutus).

Om foråret er ialt observeret 15 fra d. 23. april til d. 7. juni og om efteråret ialt 25-27 fra d. 12. juli til d. 6. nov. Af de iagttagne fugle har 70-90 / o været juv. Observationerne fordeler sig på følgende måde over de enkelte måneder: 5 ult. april, 7 med. maj, 2 ult. maj, 1 pr. juni, 2 med. juli, 3-4 pr. aug., 3 med. aug., 2 ult. aug., 3 pr. sept., 6-7 med. sept., 4 pr. okt. og 2 pr. nov.

Ride (Rissa tridactyla).

1958: 1 juv. rst. d. 5. jan. Kongelundsstranden.
1966: 1 juv. rst. d. 10. april Kongelundsstranden.

Rovterne (Hydroprogne tchegrava).

23 observeret - fortrinsvis trk. - i perioden fra d. 21. april til d. 28. aug., heraf 3 ult. april, 1 med. maj, 2 pr. juni, 1 med. juni, 2 pr. juli, 1 med. juli, 5 ult. juli, 5 pr. aug., 1 med. aug. og 2 ult. aug.

Alk (Alca torda).

Ialt 20 set på 10 forskellige observationsdage hovedsageligt i vintermånederne. Af de iagttagne fugle er 12 set jan., 5 febr., 1 okt., 1 nov. og 1 dec. Hertil kommer fund af 2 døde fugle henholdsvis fra ult. jan. 1967 og pr. marts 1964.

Lomvie (Uria aalge).

1962: 1 trk. d. 16. sept. Drager.
1963: 3 fundet døde april/maj Kongelundsstranden.
1964: 1 rst. d. 25. okt. Kongelundsstranden.

Tejst (Cepphus grylle).

5 iagttagelser, alle af en enkelt fugl. Af disse blev 2 set jan., 2 marts og 1 okt. Hertil føjes et fund af en død fugl i med. april 1966 ved Kongelundsstranden.

Natram (Caprimulgus europaeus).

7 set om foråret fra d. 10. maj til d. 29. maj. 15-20 iagttaget om efteråret fra d. 23. aug. til d. 12. okt., heraf 3-5 ult. aug., 6-7 pr. sept., 4-6 med. sept., 1 ult. sept. og 1 med. okt.

Isfugl (Alcedo atthis).

11 iagttagelser fra månederne aug./dec. fra Sjællandsbroen (2 iagtt.) og Kongelundsstranden (9 iagtt.). Af disse 11 fugle er 3 set i aug., 3 i sept., 2 i okt., 1 i nov. og 2 i dec.

Sortspætte (Dryocopus martius).

Enkelte truffet lejlighedsvis i Kongelunden, hovedsageligt i vinterhalvåret. 1 han d. 8. maj 1958, 1 d. 3. okt. 1961, 1 d. 14.-15. april 1962, 1 set 6 gange i perioden fra d. 27. dec. 1962 til d. 30. marts 1963, 2 hanner og 2 hunner iagttaget d. 5. jan. 1964 (FO 2/1966), 1 hun set d. 9. okt. 1965.

Vendehals (Jynx torquilla).

Regelmæssig i træktiden såvel forår som efterår. På optrækket er ialt set 47-51 i tidsrummet fra d. 18. april til d. 11. juni fordelt med 4 med. april, 6 ult. april, 17-19 pr. maj, 13-15 med. maj, 6 ult. maj og 1 med. juni. På nedtrækket er ialt set 41-48 i perioden fra d. 16. aug. til d. 30. sept. fordelt med 7-8 med. aug., 23-26 ult. aug., 7-10 pr. sept., 2 med. sept. og 2 ult. sept. 1 er desuden set d. 27. juli.

Bjerglærke (Eremophila alpestris).

Flokke på op til ca. 40 fugle set overvintrende på Det inddæmmede Areal nov./febr. Herudover er arten truffet i vekslende antal fra år til år på Kongelundsstranden i tidsrummet fra d. 3. okt. til d. 18. febr., ialt ca. 110 iagttaget fordelt med 16 okt., 30-35 nov., 27-30 dec., 14 jan. og 18 febr.

Pirol (Oriolus oriolus).

Enkelte truffet næsten årligt i Kongelunden om foråret fra d. 27. maj til d. 31. juni, ialt 26-32 set, heraf 3 ult. maj, 10-14 pr. juni, 9-11 med. juni og 4 ult. juni. Desuden er 1 han set på Amager Fælle d. 14. maj 1962 (FO 3/1962).

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes).

Set i Kongelunden i forbindelse med invasioner, således 1 rst. d. 16. april 1958, 3-4 iagttaget jævnlige fra ult. sept. 1961 til ult. juni 1962, i jan. 1962 blev endog et par gange set 9 fugle. Arten ynglede i Kongelunden i 1962 (D.O.F.T., årg. 59, 1965). 1-3 set hyppigt fra d. 6. aug. 1968 og resten af året.

Spætmejse (Sitta europaea).

Yderst få iagttagelser fra Kongelunds-området: 1 set d. 10. dec. 1961 (FO 3/1965), 1 iagttaget ult. aug. 1965, 1 set jævnlige fra d. 7. maj til d. 27. aug. 1966 og 2 iagttaget d. 11. nov. 1966.

Vandstær (Cinclus cinclus).

1960: 1 rst. d. 5. nov. Kongelundsstranden (D.O.F.T., årg. 58, 1965).
1965: 1 rst. d. 24. okt. Kongelundsstranden.

Ringdrossel (Turdus torquatus).

Set årligt i vekslende antal i træktiderne om foråret fra d. 7. april til d. 14. maj og om efteråret fra d. 24. sept. til d. 31. okt. På optrækket er ialt set 25-37 fordelt med 1-2 pr. april, 4 med. april, 9-15 ult. april, 9-14 pr. maj og 2 med. maj og på nedtrækket er ialt iagttaget 31-40 fordelt med 3-7 ult. sept., 18-22 pr. okt., 5-6 med. okt., 4 ult. okt. samt 1 pr. nov.

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros).

Fåttallig ynglefugl på Nord- og Østamager. Endvidere truffet i Kongelunds-området i årene 1963-66. Ialt set 9-10 om foråret fra d. 9. april til d. 7. maj, heraf 1 pr. april, 3-4 med. april og 5 pr. maj. Om efteråret er det samlede antal 6, der er observeret i tidsrummet fra d. 4. sept. til d. 23. sept. fordelt med 1 pr. sept., 1 med. sept. og 4 ult. sept.

Blåhals (Luscinia svecica).

Ialt 7 forårsagttagelser fra d. 11. april til d. 25. maj; af disse er 1 set med. april, 3 med. maj og 3 ult. maj. Kun 3 iagttagelser fra efteråret, nemlig 1 ult. aug. og 2 med. sept.

Græshoppesanger (Locustella naevia).

1966: 1 rst. d. 7. aug. Kongelundsstranden.

1968: 1 rst. d. 21. maj Kongelundsstranden.

Høgesanger (Sylvia nisoria).

Ynglede i Kongelunden til og med 1962, indtil 4 fugle blev da jævnligt set i sommerens løb; den tidligste iagttagelse er fra d. 17. maj. Efter 1962 kun få iagttagelser: 1 rst. d. 12. maj 1964 i Kongelunden (FO 2/1966), 1 par gjorde yngleforsøg i Kongelunden 1965 (FO 2/1969), 1 rst. d. 30. maj 1966 Aflandshage-området (FO 2/1969) og 1 rst. d. 20. aug. 1967 på Kongelundsstranden.

Lille Fluesnapper (Muscicapa parva).

Set hyppigt om foråret i Kongelunden fra d. 10. maj til d. 24. juni. 2 ad. hanner rastede her i længere tid henholdsvis fra d. 31. maj til d. 15. juni og fra d. 10. juni til d. 24. juni begge 1966. De øvrige forårsagttagelser udgøres af ialt 14-17 fugle, hvoraf 3-6 sås med. maj, 6 ult. maj og 5 pr. juni. 6 efterårsagttagelser fra d. 3. sept. til d. 29. okt. fordelt med 1 pr. sept., 1 med. sept., 2 ult. sept., 1 pr. okt. og 1 ult. okt.

Markpiber (Anthus campestris).

Set næsten årligt men kun om efteråret fra d. 13. aug. til d. 6. sept. Af ialt 8 iagttagelser er 1 fra med. aug., 5 fra ult. aug. og 2 fra pr. sept.

Rødstrubet Piber (Anthus cervinus).

Bortset fra 2 forårsagttagelser: 1 rst. Kongelundsstranden henholdsvis d. 15. maj 1960 og d. 11.-12. maj 1963 (D.O.F.T., årg. 59, 1966) kun set om efteråret fra d. 2. sept. til d. 18. okt. Ialt ca. 140 observeret (heraf alene 94 i 1966) fordelt med 15-16 pr. sept., ca. 65 med. sept., ca. 55 ult. sept., 4-6 pr. okt. og 1-2 med. okt.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea).

4 iagttagelser fra månederne sept./nov. heraf 1 pr. sept., 1 med. okt., 1 pr. nov. samt 1 med. nov.

Hortulan (Emberiza hortulana).

Årlige iagttagelser i træktiderne, om foråret ialt set 20 fra d. 24. april til d. 18. maj, heraf 1 ult. april, 8 pr. maj og 11 med. maj. Om efteråret ialt truffet 20-23 fra d. 17. aug. til d. 27. sept., heraf 1-2 med. aug., 12-14 ult. aug., 5 pr. sept., 1 med. sept. og 1 ult. sept.

Laplandsværbling (Calcarius lapponicus).

Enkelte set næsten årligt. Af ialt 15 observationer fra d. 13. sept. til d. 4. febr. er 2 fra med. sept., 6 fra ult. sept., 2 fra med. okt., 1 fra med. jan., 3 fra ult. jan. og 1 fra pr. febr.

Stig Kjærgaard Rasmussen
Stig Kjærgaard Rasmussen.