



1. 1976

KONGELUNDEN

Kongelunden 1, 1976.1. januar - 30. juni 1976.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, tidligste observationer, større rast- og traktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - normalt af længere varighed, og som følge heraf har variationen i fuglelivet kunnet følges meget nøje. Det registrerede træk har som for det meste om foråret for de fleste arters vedkommende været af ret beskedent omfang.

Om vejret skal følgende fremhæves: mildt vejr indtil ult. jan., hvorpå fulgte en kuldeperiode indtil ult. marts uden nævneværdig nedbør og kun afbrudt af en uges mildere vejr ult. febr. I april overvejende vestlige vinde og køligt vejr med en del regn. 8.-11. maj en hedeølge med temperaturer på op til 28° C. og vind omkring syd. Maj - juni i øvrigt mere normale temperaturer med kun lidt nedbør.

Den lange kuldeperiode febr. - marts bevirkede, at de første forårsfugle ankom relativt sent. Bortset fra næsten traditionelle iagttagelser af enkelte sjældne fuglearter er der i øvrigt ikke særlig bemærkelsesværdige observationer hverken med hensyn til de trufne arter, deres antal eller forekomsttider.

Materiale til rapporten er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Lars Nørgaard Andersen (LNA), Robert T. Andersen (RTA), Erik Begtrup (EB), Lasse Braae (LB), Jens B. Bruun (JBB), Henrik Boeg (HB), Helge Christensen (HC), Svend Christoffersen (SC), Kim Duus (KD), Knud Freisleben (KF), H. P. Jensen (HPJ), Stig Jensen (SJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Bo Klug-Andersen (BKA), Mogens Bruun Kristensen (MBK), Eigil Larsen (EL), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JEL), Svend Aage Linderström (SAL), Erik Mølgaard (EM), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Lars Paaby (LP), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Johnny L. Pedersen (JLP), Keld T. Pedersen (KTP), Peter Jørgen Petersen (PJP), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Dan Reichardt (DR), Bent Møller Sørensen (BMS), Mogens Thornberg (MT), Vibeke Tofte (VT), Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl.= Aflandshage, Kl.= Kongelunden, Kls.= Kongelundsstranden, M.= markerne omkring Kongelunden.

LOM SP. Blot følgende 4 iagttagelser rapporteret: 8/2 1 trk. Kls. (MBK), 26/3 1 trk. V. Afl. (SC), 1/6 1 trk. NØ. Afl. (SC), 22/6 2 trk. Ø. Afl. Kls. (S. LN).

TOPPET LAPPEDYKKER. De sædvanlige få iagttagelser udgøres dette halvår af følgende: 20/3 3 trk. N. Kls. (JEL, JHL, SAL), 26/6 2 Kls. (JEL, JHL, SAL), hvortil kommer 30/6 2 toppet eller gråstrubet lappedykker trk. V. Kls. (FJE).

SORTHALSET LAPPEDYKKER. Et par observationer af en art, der vist ikke tidligere er kendt fra området: 31/1 1 Kls. (BKA), 1/2 1 Kls. (MBK) - vel nok to iagttagelser af samme fugl. Hertil skal bemærkes, at det muligvis kan dreje sig om et individ, der ult. dec. - med. jan. opholdt sig ved Sjællandstranden.

LILLE LAPPEDYKKER. Set i relativt stort antal jan. febr., således jævnlige 8-16 (hovedsageligt Kls.), flest 10/1 18 Kls. (EM, SKR, VV), 24/1 20 Kls. (RTA), 25/1 20 Kls. (JEL, SAL). Marts 1-3 Kls., april - juni 2 Kls., hvortil kommer 2 pull. ult. juni. April - juni 2 Afl., ved en enkelt lejlighed flere: 19/4 4 (SC).

SKARV. Som i de foregående år mange rst. i perioden indtil med. april, derefter kun beskedent antal. På grundlag af regelmæssige optællinger kan det maksimale antal iagttagne fugle i 10-dages perioder angives således:

	primo	medio	ultimo
jan.	156	192	171
febr.	90	112	100
marts	160	146	140
april	157	105	45
maj	11	10	2
juni	6	3	21

FISKEHEJRE. Jan. - marts regelmæssigt 1-6 rst. Afl.Kls. og ved enkelte lejligheder jan. - pr. febr. lidt større antal, flest 2/1 20 Kls. (FJH), 24/1 16 Kls. (RTA,FJH,MBK,EM,SKR). April - juni noget mere uregelmæssigt 1-2 rst. Afl.Kls. Meget få trækobservationer: i alt 12 trk. i perioden pr. marts - med. april. Hertil kommer fra returtrækket: 5 trk. ult. juni.

SILKEHEJRE. 21/6 1 Afl.Kls. (SC,LN). Mon ikke dette er en ny art for området ?

RØDRUM. Jan. - febr. regelmæssige iagttagelser Afl.Kls. af indtil 4 forskellige fugle (FA,RTA,HPJ,SJ,FJH,MBK,EL,JEL,SAL,EM,LN,KMO,BBP,JLP,KTP,EVR,SKR,DR,VV,SC). Med. og ult. marts min. 2 forskellige fugle Afl.Kls. (RTA,SC,JHL,LN,EM,SKR,MT,VV). Sidste iagttagelse - og eneste fra april: 4/4 1 Afl.(SC).

KNOPSVANE. Ræt varierende rasttal med følgende "normaltal": jan. 150-250, pr. og med. febr. 50-100, ult. febr. 50-200, marts 150-250, pr. april 100-200, med. april - pr. juni max. 100, med. og ult. juni 100-200. Jan. - april 5-20 % juv. Enkelte trækiagttagelser.

SANGSVANE. Jan. - febr. regelmæssigt rst. i antal på 10-22, dog 5/1 31 Afl. (SC), marts 23-28, dog 28/3 36 Kls. (KF,EM,SKR,VV). Pr. april indtil 11 med sidste iagttagelse 7/4. Forholdsvis pænt antal juv., indtil 11 - oftest 4-8. Enkelte trækiagttagelser: 27/3 29 ad. (SC,SKR,VV), 28/3 16 (RTA,JEL,EM,SKR,VV), 31/3 3 ad. (SC,SKR), 2/4 6 (SC), 4/4 2 ad. 3 juv. (SC,LN), 7/4 6 ad. 1 juv. (SC) - i alt 66.

PIBESVANE. Som sædvanlig kun enkelte iagttagelser: 11/4 8 ad. 3 juv. trk. Ø. efter rst. Kls. (EM,LN,SKR), 12/4 1 Kls. (MBK,LN).

GRÅGÅS. Første iagttagelser: 1/2 4 trk. Ø. Kls. (LN), 11/2 4 Afl. (SC). Regelmæssigt rst. i perioden ult. febr. - pr. maj i noget varierende antal, således ult. febr. indtil 10, marts 14-24 - dog 27/3 30 Afl.Kls. (SKR), april - pr. maj indtil 18, resterende del af maj blot følgende: 15/5 32 Afl. (JEL,JHL,SAL), 27/5 9 Kls. (SKR). Fra juni kun observationer af 2-4 rst. ult. juni. Udover førsteiagttagelsen foreligger trækiagttagelser fra perioden ult. febr. - ult. maj med flest i periodens begyndelse: pr. febr. 4, ult. febr. 62, marts 39, april 20, maj 11, juni 15 - i alt 151. Observationerne i maj - juni drejer sig om sydvest- eller vestgående træk.

SÆDGÅS. Kun undtagelsesvis rst. i området: 2/1 1 Kls. (EM), 4/1 1 Kls. (EM), 26/2 4 Afl. (SC). Sporadiske trækobservationer: 4/1 29 trk. Kls. (MBK,JEL,JHL,SAL,LN), 22/2 9 trk. Ø. Kls. (SKR), 29/2 12 trk. N. Kls. (SKR), 27/3 2 trk. Afl. (SC,VV), 28/3 10 trk. Kls. (KF,EM,SKR,VV), 8/4 1 trk. Kls. (SKR). Hertil skal bemærkes, at et mindre antal trækobservationer af ubestemte gæs af slægten anser måske tilhører nærværende art.

KNORTEGÅS. Enkelte observationer: 20/3 9 Kls. (MBK), 10/4 100 knorte-/bramgæs trk. Kls. (MBK,SKR), 25/4 2 sikre samt 30 formentlig denne art trk. Kls. (JEL,SAL), 27/5 244 trk. SØ. Afl.Kls. (SKR). Fra 19/6 og resten af perioden sås 1 (mørkbuget race) rst. Afl.Kls. (SC,FJH,MBK,LN,BBP,JLP,SKR).

BRAMGÅS. Følgende oplysninger foreligger: 2/4 130 trk. Ø. Afl. (SC,VV), 4/4 60 formentlig denne art trk. NØ. Kls. (RTA,KF,SKR,VV), 10/4 100 knorte-/bramgæs trk. Kls. (MBK,SKR), 14/4 50 trk. SØ. Afl. (SKR,VV), 27/5 1 trk. SØ. Kls. (SKR). Sidstnævnte meget sene iagttagelse drejer sig om en fugl, der var med i en større flok trk. knortegæs.

KANADAGÅS. Følgende rapporteret: 9/1 2 Afl. (SC), 25/1 4 Kls. (JEL,SAL), 3/2 4 Afl. (SC), 11/2 4 Afl. (SC), 10/3 4 Kls. (JHL), 27/3 3 trk. Kls. (SKR).

CRAVAND. I hele tidsrummet jan. - med. febr. regelmæssigt indtil 14 rst. Afl.Kls. med tendens til stigende antal i periodens sidste halvdel. Mærkbar foreøgelse af antallet ult. febr. - med. marts med flest 7/3 240 Afl.Kls.(SKR) 20/3 245 Afl.Kls. (SKR). Derefter atter færre: ult. marts - pr. april 100-165, med. april - juni 75-120. Direkte forårstræk praktisk taget ikke registreret. Returtrækket indledt 7/6 2 trk. V. Afl. (SC).

GRÅND. Jan. normalt 30-120 rst. Afl.Kls., dog 5/1 min. 300 Afl. (SC). I løbet af pr. febr. stigende antal og i perioden med. febr. - ult. marts oftest 100-200 rst. Afl.Kls., ved visse lejligheder endog flere: 13/2 230 Afl. (SC), 6/3 315 Afl. (SKR), 12/3 270 Afl. (SC), 14/3 80 Afl. 240 Kls. (VV), 20/3 100 Afl. 200 Kls. (SKR). Pr. og med. april jævnt dalende antal og ult. april - pr. juni konstant 10-30 rst. Afl.Kls. Med. og ult. juni atter flere rst., oftest 40-100. Kun sparsomt træk.

KRIKAND. Nogle enkelte observationer fra vintermånederne jan. - febr.: 17/1 2 Kls. (RTA), 18/1 1 han Kls. (RTA), 25/1 1 Kls. (JEL,SAL), 26/2 3 Afl. (SC) 1 Kls. (JHL), 29/2 2 hanner 3 hunner Afl. (SKR) 1 Kls. (LN). Regelmæssigt rst. Afl.Kls. i perioden pr. marts - pr. maj, således pr. og med. marts indtil 10, ult. marts 10-25, pr. og med. april 45-85, ult. april - pr. maj 25-55, dog 1/5 30 Afl. 75 Kls. (SKR). I tiden derefter kun følgende: 12/5 4 Afl. (VV), 12/6 3 Afl. (SC), 27/6 2 Kls. (SKR), 28/6 2 Afl. (SKR). Usædvanlig få trækiagttagelser: 2/4 44 Afl. (SC), 9/4 48 Kls. (FJH), 5/6 12 Afl. (SC), 30/6 6 Kls. (FJH), hvoraf de to sidste iagttagelser hidrører fra returtrækket.

ATLINGAND. Første iagttagelse: 7/4 2 hanner 1 hun (SC,HPJ), i øvrigt april - pr. maj jævnlige iagttagelser af indtil 4 hanner 2 hunner rst. Afl.Kls. Pr. og med. juni af og til 1 han 2 hunner rst. Afl.Kls.

KNARAND. Tre iagttagelser i området af denne fåtallige gæst: 5/1 1 han Afl. (SC), 1/5 1 han 1 hun Kls. (RTA,KF,SJ,EM,SKR,VV), 21/6 1 han Kls. (BBP).

PIBEAND. Fra perioden jan. - med. febr. kun enkelte iagttagelser: 5/1 2 Afl. (SC), 6/1 2 Afl. (SC), 15/1 2 Afl. (SC), 7/2 1 Afl. (JLP). Følgende observation: 26/2 7 Afl. (SC). Derefter regelmæssigt rst. Afl.Kls. i perioden indtil pr. maj: ult. febr. - pr. marts indtil 25, med. marts 10-35, ult. marts 25-60, pr. og med. april 50-125, dog 15/4 282 Afl. (SC), ult. april - pr. maj 20-50 med faldende tendens. Igen iagttaget rst. Afl.Kls. i antal på indtil 12 med. og ult. juni. Forholdsvis beskedne træk: ult. marts 78, pr. april 142, med. april 34, ult. april 30 - i alt 284, hvortil kommer følgende: 18/6 3 trk. Ø. Kls. (FJH).

SPIDSAND. Første iagttagelse: 29/2 4 hanner 2 hunner Afl. (LN). Hyppige iagttagelser af 2 (1 par) - undtagelsesvis 3-4 - rst. Afl.Kls. pr. marts - med. maj. Pr. juni 2-3 set et par gange. Ingen registrering af direkte træk.

SKEAND. Første iagttagelser: 28/3 1 han Kls. (EM,SKR), 4/4 2 par Kls. (KF, VV). April - juni hyppige observationer af 1-4 rst. Afl.Kls., med. og ult. april samt med. juni dog lidt flere - indtil 12. Kun en enkelt trækiagttagelse. 14/4 5 trk. Kls. (SKR).

TAFFELAND. Som sædvanlig kun få observationer: 4/1 6 Kls. (MBK), 22/2 1 han Kls. (SKR), 6/4 4 hanner 1 hun Afl. (SC), 27/6 1 han Afl. (BEP).

TROLDAND. Gennem hele perioden lejlighedsvis iagttagelser af indtil 20 rst. Afl.Kls. I enkelte tilfælde flere: 4/1 52 Kls. (MBK), 16/1 80 Afl. (SC), 30/1 300 Afl. (SC), 7/2 30 trk. Kls. (SKR), 21/2 32 Kls. (FJH), 22/2 40 Kls. (SJ).

BJERGAND. Kun én iagttagelse: 1/2 5 Kls. (MBK).

HVINAND. Pr. og med. jan. konstant 40-70 rst. Afl.Kls., ult. jan. - pr. april normalt indtil 25 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere: 1/2 75 Afl. (SKR), 15/2 55 Afl. (SJ), 3/4 41 Kls. (EM). Efter pr. april blot følgende iagttagelser: 25/4 4 Afl. (SC,VV), 2/5 2 trk. Kls. (SKR), 5/6 1 Afl. (SC,JLP), 27/6 2 Afl. (SC). Kun få trækobservationer, flest 2/4 39 trk. NØ. Afl. (SC).

HAVLIT. Som sædvanlig kun få, nærmere betegnet 5 iagttagelser: 14/1 1 han Afl. (SC), 1/2 6 Kls. (EM), 26/2 2 hanner Afl. (SC,VV), 28/2 2 Afl.Kls. (RTA, MBK, JEL, SAL, LN, JLP), 15/4 1 trk. ØSØ. Kls. (FJH).

FLØJLSAND. I lighed med tidligere blot enkelte iagttagelser: 9/1 1 Afl.(SC), 10/1 1 hun fundet død Kls. (RTA), 29/1 1 han Afl. (SC), 29/2 1 hun Afl. (SKR), marts 1 hun fundet død Afl. (JLP).

SORTAND. Én observation: 17/1 2 Kls. (RTA).

EDERFUGL. Jan. - pr. marts rst. i antal på max. 60 - hyppigst 5-20, med. marts - ult. april indtil 175, dog flere ult. marts - indtil 350. I perioden maj - juni ofte betydeligt antal, flest 27/5 670 ad. 160 pull. Afl.Kls. (SKR), 19/6 1100 ad./juv. 75 pull. Afl.Kls. (SKR), 27/6 600 ad./juv. 70 pull. Afl. Kls. (SKR) - men i øvrigt under 500. Første pull. set 10/5, største antal pull. 22/5 200 (SKR). Ret beskedne træktaal: pr. jan. 5, pr. marts 23, med. marts 160, ult. marts 195, pr. april 336, med. april 153, ult. april 40, pr. maj 85, med. juni 77, ult. juni 354 - i alt 1428, hvoraf juni-iagttagelserne drejer sig om returtrækket. Største trækcifre: 18/3 125 (SC), 2/4 128 (SC)

KONGEEDERFUGL. Noteret én gang: 22/2 1 hun Kls. (KMO).

STOR SKALLESLUGER. Jan. - pr. april truffet rst. nu og da i antal på indtil 14. Adskillige trækobservationer i perioden indtil pr. maj: jan. 5, febr. 22, marts 21, april 72, pr. maj 2 - i alt 122, flest 2/4 35 (SC).

TOPPET SKALLESLUGER. I perioden jan. - pr. april normalt 5-45 rst. Afl.Kls., dog i enkelte tilfælde indtil 110 i slutningen af perioden. Med. april - ult. maj for det meste 100-300 rst. Afl.Kls., en enkelt gang flere: 15/4 525 Afl. Kls. (SC, FJH). Juni 25-75 rst. Afl.Kls. Mod sædvane en del spredte trækobservationer, dog regelmæssigt med. og ult. juni, hvor i alt 167 noteredes trk. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at trækket af denne art i almindelighed er meget vanskeligt registrerbart

LILLE SKALLESLUGER. Iagttaget i området ved følgende 3 lejligheder: 17/1 1 hun/juv. Kls. (RTA, JEL, SAL, LN), 31/1 1 han Afl. (VV), 3/2 5 Afl. (SC).

MUSVÅGE. Regelmæssigt rst. jan. - febr. 1-2 Afl. 9-10 Kls.Kl. og marts 1 Afl. 1-3 Kls., mere uregelmæssigt april - juni 1-2 Kl.Kls. Ret sparsomt træk: febr. pr. 5, pr. marts 12, med. marts 2, ult. marts 597, pr. april 301, med. april 28, ult. april 10, pr. maj 12, med. maj 1, ult. maj 2, ult. juni 2 - i alt 972. Trækiagttagelser vedr. flere end 10 fugle: 26/3 26 (SC, HPJ), 27/3 450 (SC, HPJ, SJ, LN, JLP, SKR, VV), 28/3 22 (KF, EM, SKR), 30/3 91 (FA, SC), 1/4 138 (SC), 3/4 99 (SC, SKR, VV), 7/4 52 (SC, KMO), 20/4 13 (SC, LN).

VINTERMUSVÅGE. Normalt jan. - marts 1-5 rst. Kls., undtagelsesvis indtil 10. Fra april kun følgende rst.: 2/4 1 Kls. (FA), 25/4 1 Kls. (VV). Få trækobservationer: 20/3 1 (SKR), 27/3 4 (SC, LN), 7/4 1 (KMO), 12/4 1 (SC), 18/4 1 (JEL), 21/4 1 (SC), 24/4 1 (MBK), 30/4 3 (SC), 1/5 1 (JEL, JHL) - i alt 14.

RØD GLENTE. 2 iagttagelser: 3/4 1 trk. NØ. Afl. (SC, SKR, VV), 20/4 1 trk. N. Kls. (LN).

HVEPSEVÅGE. 1 rst. i området nu og da i maj - juni. Spredt og sparsomt træk maj - juni - i alt 276 - flest 16/5 193 (FA, HPJ, LN, BBP), 1/6 66 (SC).

RØRHØG. Første iagttagelser: 30/3 1 ad. han Kls. (SC), 1/4 1 ad. han trk. Afl. (FA, SC). April - maj hyppige iagttagelser af 1 han 1 hun rst. Afl.Kls. - undtagelsesvis indtil 3 hanner. Juni 1 han 1 hun 1 juv. truffet rst. Afl. Kls. Samtlige trækiagttagelser: 1/4 1 (SC), 2/4 1 ad. han (FA), 4/4 1 ad. han (KF, SKR, VV), 10/4 1 han (MBK), 15/4 1 hun (SC), 16/4 1 han 1 hun (SC), 19/4 1 hun (SC), 20/4 2 hanner (SC), 21/4 2 hanner (SC), 27/4 1 (SC), 28/4 2 hanner (SC), 30/4 7 (SC), 1/5 2 hanner (JLP, SKR), 15/5 1 ad. han (JEL, JHL, SAL), 16/5 2 hanner (FA, LN) - i alt 27, hvilket er betydeligt flere end sædvanligt.

BLÅ KÆRHØG. Jan. - med. april næsten daglige iagttagelser af 1-3 hunner/juv. rst. Afl.Kls., hvortil kommer mere sporadiske observationer jan. - marts af indtil 3 forskellige hanner rst. Direkte træk blot registreret 5 dage: 26/2 2 hunner/juv. (SC), 7/4 1 hun/juv. (KMO), 18/4 1 han (SC), 30/4 1 ad. han 8 hunner/juv. (SC), 1/5 3 hunner/juv. (RTA, JEL, JHL, EM, JLP, SKR, VV) - i alt 16.

HEDEHØG. 7/6 1 hun trk. Ø. Afl. (SC). Arten kan vel lige akkurat betegnes som årlig på lokaliteten.

DUEHØG. I lighed med de senere år regelmæssige iagttagelser af arten jan. - marts. Mindst 3 forskellige individer set: 1 ad. han 1 juv. han 1 ad. hun. 4 trækobservationer: 28/3 1 (EM, SKR), 9/4 1 han (SC), 20/4 1 han (SC), 1/5 1 ad. hun (FA).

SPURVEHØG. Gennem hele perioden regelmæssige iagttagelser af 1-2 rst. og lejlighedsvis 3-4 rst. Kun få trk. - i alt 165 - i perioden jan. - pr. juni med det største antal i tidsrummet ult. marts - med. april og med følgende observationer på mere end 10 fugle: 1/4 17 (SC), 2/4 23 (SC), 7/4 11 (SC), 30/4 19 (SC, VV).

FISKEØRN. Ingen rasteiagttagelser. I alt 19 trk. fordelt på følgende måde: 1/4 2 (SC), 2/4 5 (FA, SC), 3/4 1 (SC, HPJ, SKR, VV), 7/4 2 (SC), 8/4 2 (SC), 10/4 1 (JLP, SKR, VV), 13/4 1 (JBB), 14/4 2 (SKR, VV), 30/4 2 (FA, SC), 1/5 1 (JEL, JHL) - i alt 19. Antallet normalt.

LÆRKEFALK. Sæsonens traditionelle observationer er følgende: 5/5 1 trk. N. Kls. (FA), 19/5 1 Kl. (EM, SKR), 20/5 1 Kl. (FA), 13/6 1 ad. trk. Kls. (LN).

DVÆRGFALK. Jan. - med. april regelmæssigt 1-2 rst. - fortrinsvis Afl. Blot 2 trækiagttagelser: 26/4 1 (SC), 1/5 4 (JEL, JHL, JLP, SKR, VV).

AFTEBNFALK. 22/5 - 23/5 1 hun (2. års) Kl. (JBB, SJ, EM, DR).

TÅRNFALK. Jan. - febr. næsten daglige iagttagelser af 1-2 Afl. 1-5 Kls. rst. marts - juni tilsvarende 1-2 Afl. 1-3 Kls. Kl. Samtlige trækiagttagelser: 1/2 1 VSV. (LN), 27/3 1 (SC, LN, VV), 1/4 1 (SC), 8/4 1 (SC, VV), 10/4 1 (MBK), 24/4 1 (MBK), 30/4 2 (SC, VV), 1/5 3 (SKR, VV) - i alt 11, hvilket ikke er synderligt imponerende.

AGERHØNE. Jan. - febr. småflokke med i alt 20 individer Afl.Kls. Marts - juni 2 par Afl. 2 par Kls. og 3-4 par M.

TRANE. Iagttagelser fra april - fortrinsvis 1. halvdel - udelukkende af trk. fugle: 2/4 18 (FA, SC), 3/4 10 (SC, SKR, VV), 8/4 3 (SC, VV), 11/4 8 (EM), 16/4 5 (JLP), 17/4 12 (SC), 18/4 2 (SC), 23/4 2 (VV) - i alt 60.

VANDRIKSE. En vinteriagttagelse: 23/1 1 Afl. (SC). Desuden følgende: 4/4 1 Kls. (BBP), 8/4 1 Kls. (HPJ), 12/4 2 Kls. (SJ, MBK), 13/4 2 Kls. (SJ), 7/5 1 Kls. (HPJ, MBK), 19/6 1 Kls. (SKR), hvortil skal bemærkes, at arten sædvanligvis ikke træffes regelmæssigt på lokaliteten uden for træktiderne.

GRØNBENET RØRHØNE. Vinteriagttagelser: 17/1 2 Kls. (RTA), 18/1 1 Kls. (LN), 29/1 1 Kls. (FJH), 1/2 2 Kls. (RTA, EM, SKR), 7/2 1 Kls. (SKR). Først regelmæssige iagttagelser fra pr. april. I perioden derefter 1-2 Afl. og indtil 10 K.

BLISHØNE. Jan. - febr. noget varierende antal, oftest 500-900 Afl.Kls. Rekordantal i marts, således 20/3 min. 1300 Kls. (RTA, EM, SKR, VV). Pr. og med. april stadig mange, men dog dalende antal. Ult. april - med. maj 100-150 Afl. Kls., ult. maj - juni 20-55 Afl.Kls.

STRANDSKADE. Eneste vinteriagttagelse: 22/2 1 Kls. (SC). Første forårsagttagelse - tilmed med større antal: 29/2 15 Afl. 4 rst. 15 trk. Kls. (RTA, LN, SKR, VV). Regelmæssige iagttagelser fra pr. marts med antallet stigende til kulmination ult. marts: 28/3 300 rst. Kls. (BEP). Derefter atter lavere rast-antal Afl.Kls.: pr. april 125-175, med. april - pr. maj 65-130, med. maj - med. juni 10-42, ult. juni 50-70. Enkelte trækiagttagelser fra optrækket: ult. febr. 15, med. marts 67, ult. marts 220, pr. april 10 - i alt 312. Nedtrækket indledtes pr. juni: 5/6 1 trk. Afl. (SC).

VIBE. Én januar-observation: 4/1 3 trk. Ø. Kls. (SAL). Første forårsfugle dukkede op på lokaliteten ult. febr.: 25/2 18 trk. Afl. (SC), 26/2 5 Kls. (JHL) 30 trk. Afl. (SC). I øvrigt ult. febr. - med. marts regelmæssigt 5-30 rst. Afl.Kls., ult. marts - juni 40-50 Afl. 40-50 Kls. Temmeligt pønt træk ult. febr. - med. april: ult. febr. 348, pr. marts 5, med. marts 153, ult. marts 197, pr. april 46, med. april 3 - i alt 372. Returtrækket påbegyndtes 5/6 2 trk. Afl. (SC).

STOR PRÆSTEKRAVE. Første iagttagelser på normalt tidspunkt: 27/2 2 Afl. (SC) og allerede mange 28/2 28 Afl.Kls. (RTA, JEL, SAL, LN, JLP, VV). Regelmæssigt rst. derefter: marts - pr. april 10-20 Afl. 30-50 Kls., med. april - juni 15-25 Afl. 15-25 Kls. Returtrækket indledtes 26/6 3 trk. Kls. (FJH).

STRANDHJEJLE. Én vinteriagttagelse: 31/1 1 Kls. (MBK, LN). Forholdsvis mange iagttagelser maj - juni, nemlig: 9/5 1 Afl. (JLP), 16/5 1 trk. Kls. (LNA, KD), 22/5 1 Afl. (JLP), 27/5 1 Afl. (SKR), 29/5 2 Afl. (JLP) 8 Kls. (SAL), 4/6 2 Afl. (SC), 5/6 1 Afl. (SC, JLP), 8/6 1 Afl. (SC), 12/6 1 juv. Afl. (SC, LN), 14/6 2 Afl. (SC).

HJEJLE. 1-5 set 14 gange Afl.Kls. i perioden ult. febr. - pr. maj. I juni enkelte observationer af 1-2 rst. Afl. Returtrækket påbegyndt 7/6 1 trk. Kls. (LN).

STENVENDER. En enkelt iagttagelse uden for den normale observationsperiode: 10/4 1 Kls. (MBK). Efterfølgende iagttagelse: 28/4 1 Afl. (SC). Dernæst spredte iagttagelser ult. april - maj af 1-3 rst. Afl.Kls., dog 1/5 3 Afl. 5 Kls. (RTA, KF, EM, SKR, VV) og 5/5 5 Kls. (JBB). Juni næsten daglige observationer af 1-3 rst. Afl.Kls., dog ingen iagttagelser fra sidste uge i måneden.

DOBBELTBEEKKASIN. Grundet det milde vejr i jan. mange iagttagelser fra denne måned, derimod kun en enkelt fra febr. (koldt vejr): 2/1 2 Afl.Kls. (SC, FJH, JLP), 4/1 4 Afl. (SC), 5/1 3 Afl. (SC), 6/1 1 Afl. (SC), 7/1 2 Afl. (SC), 10/1 6 Afl. (SC), 11/1 1 Afl. (SC), 13/1 2 Afl. (SC), 18/1 1 Afl. (SC) 1 Kls. (EM, SKR), 24/1 3 Afl. (SC, SKR), 26/1 1 Afl. (SC), 27/1 6 Afl. (SC), 1/2 1 Kls. (KD) 1 Afl. (SKR). Dernæst: 6/3 1 Afl. (SKR), 7/3 1 Afl.Kls. (RTA, SKR, VV). I den følgende tid nu og da 1 Afl. 1 Kls. og fra 26/3 til pr. maj ofte 5-12, dog enkelte dage flere: 31/3 15 Kls. (SKR), 3/4 2 Afl. (SKR) 23 Kls. (EM, SKR), 4/4 15 Kls. (SKR, VV), 24/4 12 Afl. 10 Kls. (SKR). Med. maj - juni nogle gange 1 Afl. 1 Kls.

ENKELTBEEKKASIN. Samtlige observationer: 6/3 1 Afl. (SKR), 3/4 1 Kls. (EM, SKR), 12/4 3 Kls. (SJ, MBK), 2/5 1 Kls. (SJ, MBK), 8/5 1 Kls. (MBK).

SKOVSNEPPE. Alle iagttagelser skal nævnes: 6/3 1 fundet død Kl. (SJ, LN), 26/3 1 Afl. (SC), 27/3 2 Kl. (SJ), 28/3 2 Kl. (RTA, SJ, MBK, LN), 31/3 4 Kl. (MBK), 10/5 1 Kl. (HPJ), 11/5 1 Kl. (HPJ), 16/5 1 Kl. (BBP), 23/5 1 Kl. (SJ, EM), 24/5 1 Kl. (BBP), 7/6 1 Kl. (BBP), 13/6 1 Kl. (SJ).

STORSPOVE. Tidligste iagttagelser: 29/2 1 trk. Ø. Kls. (JBB, SKR, VV), 19/3 7 trk. Afl. (SC). Kun få rastiagttagelser: 4/4 4 Afl.Kls. (RTA, SC), 20/3 1 Afl. (JLP), 19/6 1 Afl. (SKR), 22/6 1 Kls. (LN), 26/6 1 Kls. (FJH). Forholdsvis mange på optrækket: ult. febr. 1, med. marts 8, ult. marts 45, pr. april 36, med. april 4, ult. april 87, pr. maj 49 - i alt 230. Største træktal: 25/4 68 (SC, KF, VV), i øvrigt under 15 pr. dag. Returtrækket indledtes 5/6 2 trk. Afl. (SC).

SMÅSPOVE. Kun få observationer: 24/4 1 trk. Afl. (SC, JLP, SKR), 25/4 5 trk. Afl. (SC, VV), 1/5 1 trk. Afl. (JLP, SKR, VV), 17/6 1 Afl. (SC), 27/6 4 trk. Afl. Kls. (FJH, SKR), 28/6 1 trk. Afl. (SJ), 29/6 1 Kls. (FJH), 30/6 3 trk. Afl.Kls. (SC, FJH).

STOR KOBBERSNEPPE. 2 observationer, hvilket må betegnes som normalt: 14/4 1 Afl. (SKR, VV), 9/5 2 Afl. (SJ).

LILLE KOBBERSNEPPE. Normalt antal iagttagelser, som alle skal nævnes: 26/3 4 Kls. (VV), 28/3 5 trk. Afl. (SC) 5 Kls. (KF,EM,SKR,VV), 10/4 1 trk. Afl. (JLP,SKR,VV) 1 Kls. (HPJ), 13/4 15 Afl. (SC), 20/4 4 trk. Afl. (SC), 26/4 1 Afl. (SC), 28/4 4 trk. Afl. (SC), 30/4 3 trk. Afl. (SC), 1/5 2 Afl. (JLP,VV) 2 Kls. (EM,SKR), 2/5 2 Kls. (SKR), 10/5 2 Kls. (SKR), 15/5 3 Afl. (JEL,JHL,SAL,JLP), 27/5 30 trk. Kls. (SKR), 1/6 1 Afl. (SC), 22/6 1 trk. Kls. (LN), 23/6 2 trk. Kls. (LN), 28/6 6 trk. Afl.Kls. (SC,SKR,VV), 30/6 6 trk. Afl. (SC).

SVALEKLIRE. Første iagttagelse tidlig: 27/3 1 Afl. (SC,SKR). Øvrige observationer: 2/4 1 Afl. (VV), 3/4 3 Afl. (SC,SKR,VV) 4 Kls. (KF,HPJ,EM,SKR,VV), 4/4 2 Kls. (SKR,VV), 8/4 1 Kls. (SKR), 10/4 1 Afl. (JLP,SKR,VV) 1 Kls. (SKR), 25/4 1 Kls. (RTA,VV), 6/5 1 Kl. (SJ), 8/5 2 Kls. (MBK), 14/6 1 Afl. (SC), 20/6 1 Kls. (HPJ), 21/6 2 Kls. (HPJ), 22/6 1 Kls. (LN), 26/6 2 Afl. (SC) 2 Kls. (FJH), 27/6 1 Kls. (SKR).

TINKSMED. Som sædvanlig en del maj-iagttagelser: 5/5 1-2 Kls. (JBB), 8/5 2 Kls. (MBK,VV) 1 Afl. (VV), 9/5 1 Kls. (JEL,SAL), 10/5 2 Kls. (SKR), 12/5 4 Kls. (VV), 22/5 1 Kls. (DR), 27/5 3 Kls. (SKR), 30/5 2 Afl. (VV). Endvidere følgende observationer fra returtrækket: 17/6 2 Afl. (SC), 18/6 5 Afl. (SC) 5-10 Kls. (LN), 19/6 2 Afl. (SC,SKR) 15 Kls. (LN,SKR), 20/6 8 Afl. (SC) 6 Kls. (LN), 22/6 20 Kls. (MBK,LN), 23/6 1 Afl. (SC) 15-20 Kls. (LN), 24/6 20 Kls. (SJ,LN), 25/6 5 Afl. (SC) 1 Kls. (FJH), 26/6 4 trk. Afl. (SC) 35 Kls. (FJH,SJ,JEL,JHL,SAL), 27/6 22 Kls. (SKR), 28/6 3 trk. Afl. (SC,SKR,VV) 3 Kls. (HPJ,FJH), 29/6 8 rst. 41 trk. Kls. (FJH), 30/6 4 trk. Afl. (SC) 8 rst. 5 trk. Kls. (FJH).

RØDBEN. Adskillige overvintrende. Jan. - med. marts næsten daglige iagttagelser af oftest 5-12 rst. Afl.Kls., undertiden nogle flere med største antal: 24/1 21 Afl. (SC), 31/1 23 Kls. (MBK), 4/2 22 Afl. (SC). Forårstræk registreret ult. marts, således antallet stigende til 27/3 135 Kls. (SJ), 31/3 78 Afl. (SC) 50 Kls. (SKR). I perioden april - juni 100-200 rst. Afl.Kls. - oftest 100-125. Returtrækket indledtes 18/6 1 trk. Kls. (FJH).

SORTKLIRE. Som sædvanlig kun få registreret på optrækket: 1/5 2 Kls. (KF,EM,SKR,VV), 2/5 1 Afl. (SJ) 1 Kls. (MBK,VV), 8/5 1 Afl. (VV). Mange juni-iagttagelser: 6/6 4 Afl.Kls. (SC,LN), 7/6 7 trk. Afl.Kls. (SC,LN) 1 Kls. (BBP), 8/6 5 Afl. (SC), 10/6 1 Afl. (SC), 12/6 5 trk. Afl. (SC) 2 Kls. (LN), 13/6 2 ad. Afl. 3 ad. Kls. (SKR), 14/6 6 Afl. (SC), 18/6 1 Afl. (SC) 1 Kls. (LN), 19/6 2 Kls. (LN,SKR), 20/6 3 Afl. (SC) 2 Kls. (LN), 22/6 2 trk. Afl. (SC), 23/6 1 Afl. (SC), 25/6 2 Afl. (SC), 27/6 2 ad. trk. Kls. (SKR), 28/6 4 trk. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR), 29/6 2 trk. Kls. (FJH).

HVIDKLIRE. Usædvanlig få observationer fra optrækket: 19/4 1 Afl. (SC), 22/4 1 Afl. (SC), 25/4 1 Afl. (SC,VV), 1/5 3 Afl. (JLP,VV,SKR), 6/5 1 Kls.(SJ), 9/5 1 Afl. (JLP). Fra nedtrækket følgende: 14/6 1 Afl. (SC), 20/6 1 Kls. (BBP), 22/6 3 trk. Afl. (SC), 23/6 1 trk. Afl. (SC), 24/6 2 trk. Afl. (SC), 25/6 1 Afl. (SC), 28/6 2 rst. 24 trk. Afl.Kls. (SC,FJH,SKR,VV), 29/6 1 rst. Kls.(FJH) 22 trk. Afl.Kls. (SC,FJH), 30/6 6 trk. Kls. (FJH).

MUDDERKLIRE. Beskedent antal iagttagelser såvel fra optrækket som begyndelsen af nedtrækket: 29/4 1 Afl. (SC), 1/5 1 Afl. (JLP,SKR) 1 Kls. (KF,EM,SKR,VV), 6/5 3 Kls. (HPJ,SJ,VV), 8/5 1 Afl. (VV), 9/5 1 Afl. (JLP), 14/5 2 Kls. (VV), 15/5 1 Afl. (SJ), 30/5 1 Kls. (VV), 27/6 1 Kls. (SKR), 29/6 1 Afl. (SC) 2 Kls. (FJH), 30/6 1 Kls. (FJH).

ISLANDSK RYLE. Normalt iagttagelsesantal: 19/4 4 trk. Afl. (VV), 15/5 2 Kls. (SJ), 1/6 1 Afl. (SC), 2/6 1 Afl. (SC), 19/6 1 Afl. (SC,SKR), 25/6 1 Afl. (SC) 1 ad. trk. Kls. (BBP), 26/6 1 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE. Følgende registreret: 6/1 1 Afl. (SC), 31/1 1 Kls. (BKA), 30/4 1 Afl. (SC,VV).

DVÆRGRYLE. De normale iagttagelser fra perioden maj - pr. juni foreligger: 10/5 1 Kls. (KD), 29/5 1 Afl. (JLP), 1/6 1 Afl. (SC), 5/6 1 Afl. (SC). Hertil kommer observationer fra med. og ult. juni, hvilket er uden for artens sædvanlige forekomsttid: 17/6 2 Afl. (SC), 18/6 2 Afl. (SC), 22/6 2 Afl. (SC), 23/6 3 Kls. (BBP), 26/6 1 Afl. (SC,JLP), 30/6 2 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE. Mindre antal set i maj. Første iagttagelse: 5/5 1 Kls. (JBB), hvilket er tidlig. Øvrige observationer: 9/5 1 Kls. (RTA, JEL, SAL), 10/5 3 Kls. (KD, SKR, VV), 12/5 7 Kls. (EM), 15/5 3 Kls. (SJ, JEL, JHL, SAL), 16/5 8 Kls. (KD, LNA, HPJ, VV), 18/5 6 Kls. (HPJ, SKR), 19/5 1 Kls. (HPJ), 22/5 9 Kls. (RTA, DR), 27/5 1 Afl. (SKR), 29/5 1 Afl. (JLP).

ALM. RYLE. Jan. - med. marts så godt som daglige observationer af noget varierende antal - oftest 15-35 - dog lejlighedsvis indtil 60 rst. Afl.Kls. Ult. marts antallet stigende til 230. I øvrigt følgende rasttal Afl.Kls.: april - maj oftest 200-500, dog 15/5 1700 Afl. (JLP), 22/5 900 Kls. (MBK). Bortset fra 1/6 220 Afl. (SC) i juni 10-50 rst. Afl.Kls. Med undtagelse af 27/3 150 trk. (SJ), 15/5 300 trk. (SJ) ingen trækobservationer fra optrækket. Returtrækket indledtes 19/6 2 trk. Kls. (LN).

KRUMNÆBBET RYLE. Iagttagelserne er hurtigt oversete: 22/5 1 Afl. (JLP), 1/6 1 Afl. (SC). Altid kun få observeret på optrækket.

SANDLØBER. Arten nåede akkurat at blive noteret: 6/6 1 Afl. (SC). Normalt ses meget få om foråret.

BRUSHANE. Første iagttagelse ret tidlig: 28/3 1 Kls. (RTA, KF, MBK, SJ, JEL, EM, LN, BBP, SKR, VV). Næste iagttagelse: 4/4 2 Kls. (RTA, SKR, VV), derefter regelmæssigt rst. Afl.Kls.: april indtil 16, pr. og med. maj 20-40, ult. maj - ult. juni 1-6. Dog 19/6 10 Afl. 12 Kls. (SKR), Returtrækket indledtes 22/6 12 trk. (LN).

KLYDE. Første iagttagelse relativt sen: 26/3 2 Afl. (SC). Følgende observation: 27/3 1 Afl. (SC, SKR, VV) 3 Kls. (SKR). Regelmæssigt rst. Afl.Kls. - fortrinsvis Afl. - i tiden derefter: ult. marts - med. maj indtil 20 med stigende tendens i periodens anden halvdel, ult. maj - juni 20-30, dog 22/5 50 Afl. (SKR). Eneste trækobservation fra optrækket: 2/4 25 trk. Ø. Afl. (SC). Returtrækket indledt 22/6 4 trk. Afl. (SC).

ALM. KJOVE. Som regel yderst få iagttagelser fra årets første halvdel og dette halvår alene en tidlig observation fra returtrækket: 13/6 1 ad. (lys fase) trk. SV. Kls. (LN).

SVARTBAG. I hele perioden normalt 10-25 Afl.Kls., dog ult. febr. - marts ofte indtil 55.

SILDEMÅGE. Kun 1 iagttagelse rapporteret: 14/3 1 Kls. (JEL, SAL).

ROVTERNE. Følgende observation udgør sæsonens eneste: 27/6 1 trk. Kls. (BBP).

FJORDTERNE. Færre iagttagelser kan dårligt forekomme: 24/6 1 Kls. (SJ), 26/6 4 Kls. (JEL, JHL, SAL).

HAVTERNE. Normal ankomst: 7/4 2 Afl. (SC). Næste observation: 11/4 2 Afl.Kls. (SC, LN, SKR). Med. april - juni regelmæssigt 20-30 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere: 22/5 40 Kls. (DR).

DVÆRGTERNE. Første iagttagelser: 23/4 1 Afl.Kls. (SC, VV), 24/4 1 Afl. (SC, JLP, SKR). Pr. og med. maj sædvanligvis 4-8 rst. Afl.Kls., ult. maj - juni hyppigt 12-17 Afl.Kls.

SPLITTERNE. Tidligste iagttagelser: 30/3 1 Afl. (SC), 31/3 2 Afl. (SC). Største antal: 1/5 4 Afl. 20 Kls. (RTA, KF, SKR, VV), 14/6 13 Afl. (SC), men i øvrigt i hele perioden hyppigt 1-6 rst. Afl.Kls.

TEJST. Eneste af slagsen: 28/2 1 fundet død Afl. (RTA, JEL, SAL, JLP).

HULDUE. Betydeligt flere end i adskillige år, således set i relativt stort antal fortrinsvis i perioden ult. febr. - pr. april. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 4/1 1 Kl. (MBK), 22/2 1 Kls. (SKR), 29/2 11 rst. 15 trk. Kls. (RTA, JBB, EL, LN, SKR, VV), 7/3 10 Kl. (RTA), 13/3 4 Afl. (SC) 15 Kl. (RTA), 14/3 36 trk. Afl.Kls. (SC, VV) 23 Kl. (SJ, LN), 17/3 25 trk. Ø. Afl. (SC) 32 Kls. (SKR), 20/3 2 Afl. (JLP, SKR) 22 Kls. (JEL, JHL, SAL, SKR) 32 Kl. (MBK, EM), 24/3 45 trk. Afl. (SC), 26/3 3 Kls. (VV), 27/3 3 Kl. (SJ), 28/3 2-5 rst. 39 trk. Kls. (RTA, KF, MBK, JEL, EM, SKR, VV), 30/3 15 trk. Afl. (SC), 1/4 12 trk. Afl. (SC), 3/4 3 trk. Kls. (SKR), 4/4 4 Kls. (RTA), 7/4 6 trk. Afl. (SC), 10/4 8 trk. Kls. (MBK).

RINGDUE. Sædvanligvis 25-100 rst. Afl.Kls.Kl., i jan. - med. april dog af og til indtil 500 Afl.Kls.Kl. og enkelte gange endnu flere, således: 6/1 1000 Kl. (FJH), 28/3 1000 Kl. (RTA,SJ), 2/4 3000 Kl. (HPJ), 4/4 1000 Kl. (RTA,SKR), 8/4 600 Kls. (SKR). Trækiagttagelser: ult. febr. 60, ult. marts 797, pr. april 301, med. april 40 - i alt 1198, flest 24/3 350 (SC), 27/3 351 (SC,SKR).

TYRKERDUE. I lighed med tidligere kun iagttagelser fra årets første halvdel i beskedent omfang, således jan. - febr.: 1/1 5 Kl. (FJH), 14/2 7 M. (MBK) samt sporadiske observationer ult. april - juni 1-3 rst. Afl.Kls.Kl.

UAC. Første iagttagelser: 6/5 1 Kl. (HPJ,SJ), 7/5 1 Kl. (SKR). I øvrigt maj - juni indtil 7 Afl.Kls.Kl., dog 26/6 16 Kl.Kls. (JEL,JHL,SAL).

MURSEJLER. Første iagttagelser sene: 14/5 5 Kls. (HPJ,VV), 16/5 2 Kls. (VV). I øvrigt maj - juni indtil 150 Afl.Kls., dog overstiger enkelte træktal dette ciffer: 17/5 200 trk. Kls. (FA), 5/6 1000 trk. Kls. (RTA), 28/6 300 trk. Kls. (SKR), 30/6 fl. tusinde rst./trk. Kls. (FJH).

SKOVHORNUGLE. Jan. - pr. april indtil 14 - oftest 5-10 - især set Kl. I periodens sidste del lejlighedsvis 1 Kl.

PERLEUGLE. Jan. - ult. febr. 2 Kl. (FA,LNA,EB,HB,LB,JBB,RTA,HC,SC,HPJ,SJ, JEL,JHL,SAL,EM,LN,DR,EVR,SKR,KMO,VV), pr. og med. marts 1 Kl. (RTA,HC,SC,HPJ, SJ,VV). Følgende observationer af flere end to: 18/1 3 Kl. (BBP), 22/2 3 Kl. (BMS).

MOSEHORNUGLE. Blot følgende observationer: 4/1 1 Afl. (SC), 4/3 1 Kls. (FA), 20/3-21/3 1 død Kls. (SJ,MBK,LN), 9/4 1 Afl. (SC), 25/4 2 Afl. (SC), 5/5 1 trk. Kls. (HPJ), 17/5 1 Kls. (FA), hvilket er væsentligt færre end normalt.

STOR FLAGSPØTTE. I hele perioden 1-6 Kl.

LILLE FLAGSPØTTE. Jan. - pr. april følgende 7 observationer - vel af samme fugl: 10/1 1 hun Kl. (RTA), 2/2 1 hun Kl. (JBB), 7/2 1 hun Kl. (SJ), 22/2 1 hun Kl. (KMO,BMS), 6/3 1 Kl. (MBK), 14/3 1 hun Kl. (SJ,LN), 4/4 1 hun Kl. (BBP).

VENDEHALS. Sæsonens traditionelle iagttagelser udgøres af: 23/4 1 Afl. (SC, VV), 4/5 3 Kl. (KD), 5/5 1 Kl. (JBB), 6/5 1 Kl. (SJ), 7/5 1 Kl. (MBK), 9/5 1 Afl. (FA) 1 Kl. (JEL,SAL), 22/5 1 Kl. (DR).

HEDELÆRKE. Iagttagelse fra et usædvanligt tidspunkt: 4/1 2 trk. Kls. (SAL). Derudover kun to observationer: 7/4 5 trk. Afl. (SC), 13/4 3 trk. Afl. (SC).

SANGLÆRKE. Jan. - med. febr. normalt 5-10 Afl.Kls., dog lejlighedsvis indtil 35 Afl.Kls. og undtagelsesvis endnu flere: 4/1 200 Afl. (SC). Ult. febr. begyndte forårstrækket for alvor med stigende rastantal til følge, således ult. febr. 100-150 Afl.Kls. Marts - pr- april normalt 50-200, dog 9/3 250 Afl.(SC), 11/3 300 Afl. (SC), 3/4 150 Afl. 120 Kls. (SKR). Med. april - juni 40-50 Afl. Kls. Ret sparsomt træk: pr. jan. 71, febr. 174, marts 487, april 34 og pr. maj 5 - i alt 771.

BJERGLÆRKE. Ret pænt antal: 4/1 2 Kls. (JEL,JHL,SAL), 9/1 12 Afl. (SC), 10/1 12 Afl. (SC), 28/2 20 Afl. (JEL,SAL), 7/3 7 Kls. (MBK), 26/3 4 Afl. (SC).

LINDSVALE. Første iagttagelser: 20/4 4 trk. Afl.Kls. (SC,SJ,LN), 1/5 1 Kl. (SKR,VV). I øvrigt yderst sparsom forekomst maj - juni, oftest i antal på 5-10 Afl.Kls. og kun undtagelsesvis flere - indtil 50 Afl.Kls. Praktisk taget ingen trækiagttagelser.

BYSVALE. Første iagttagelser meget sene: 8/5 2 Afl. (VV), 9/5 1 Kls. (HPJ). I øvrigt indtil 10 pr. og med. maj og ult. maj - juni oftest 30-40 rst. Afl. Kls. Meget få trækobservationer.

DIGESVALE. Første iagttagelser: 9/5 1 Kls. (HPJ), 10/5 1 Kls. (VV), hvilket er meget sene. 27/5 18 trk. Kls. (SKR), men ellers kun få iagttagelser af 1-3 Afl.Kls. med. og ult. maj. En enkelt juni-iagttagelse: 28/6 1 Afl. (VV), hvortil skal føjes, at arten - hvis overhovedet - kun yngler meget fåtalligt på Amager.

BYNKEFUGL. Første iagttagelser: 5/5 1 han M. (HPJ), 6/5 5 M. 20 Kls. (SJ,VV), 7/5 13 M.Kl. (SKR). I øvrigt pr. og med. maj normalt 1-5 M.Kls., hvortil yderligere skal føjes: maj - juni 2 ynglepar Afl. Arten er tilsyneladende ikke i de seneste år truffet ynglende i selve området.

RØDSTJERT. Første iagttagelser ret sene: 2/5 1 han Kls. (VV), 5/5 1 han Kl. (HPJ). En del iagttagelser pr. maj, flest 6/5 12 Kl.Kls. (SJ,VV), 7/5 10 Kl.M. (MBK,SKR). Med. maj - juni 2 hanner syngende Kl.

HUSRØDSTJERT. 3 observationer foreligger: 4/4 1 han Kls. (RTA,LM,BBP), 10/4 1 hun (HPJ), 12/4 1 hun Kls. (SJ,MBK).

NATTERGAL. Første iagttagelser: 8/5 1 Kl. (HPJ), 10/5 1 Kl. (SKR,VV). Ult. maj - juni 15-20 syngende Kl.

BLÅHALS. En enkelt iagttagelse: 18/5 1 han Kls. (HPJ).

RØDHALS. Jan. - marts regelmæssigt 5-8 Afl.Kl.Kls. Gennemtræk registreret april - pr. maj, men ingen oplysninger om større koncentrationer. Maj - juni 15-25 syngende Kl.

GRÆSHOPPESANGER. 16/5 1 Kls. (JBB), hvilket er alt i denne omgang.

RØDSANGER. Første iagttagelser: 12/5 2 Kls. (SKR), 13/5 1 Kls. (VV). I den efterfølgende tid indtil 14 syngende Afl.Kls.Kl., hvoraf 6 Afl. 6 Kls. var stationære til periodens slutning.

KARSANGER. Første iagttagelser: 22/5 1 Afl. (SKR), 27/5 1 Afl. 1 Kl. (SKR). Ult. maj - juni truffet syngende 3 steder Kls. og 2 steder Afl.

SIVSANGER. Første iagttagelser: 8/5 1 Kls. (MBK,VV), 10/5 1 Kls. (SKR). Maj - juni iagttagelser af formentlig kun 4 forskellige syngende Kls., hvoraf 2 i juni forblev stationære til periodens slutning.

GULFUGL. Første iagttagelser: 9/5 1 Kl. (SJ), 12/5 4 Kl. (SKR). Antallet øgede til 30 syngende Kl. ult. maj. Juni også 2 syngende Afl. og 1 syngende Kls.

MUNK. Første iagttagelser: 30/4 1 Kl. (SKR), 1/5 2 Kl. (SKR,VV), derefter stigende antal, således med. maj - juni ca. 35 syngende Kl. Gennemtræk konstateret ult. maj, således 23/5 52 hanner Kl. (SKR).

HAVESANGER. Første iagttagelser: 12/5 4 Kl. (SKR), 13/5 1 Kl. (VV) og hurtigt stigende antal, således ult. maj - juni ca. 35 syngende Kl. 1 Afl. 1 Kls.

TORNSANGER. Første iagttagelser: 6/5 6 Kls. (SJ,VV), 10/5 1 Kls. (SKR). Ult. maj - juni regelmæssigt ca. 15 syngende i området, hvoraf 4 Afl. og 8-10 Kls.

GÅRDESANGER. Første iagttagelser meget sene: 7/5 3 Kl. (SKR), 8/5 2 Kl. 1 Kls. (VV). Med. maj - juni 10-15 truffet syngende i området.

LAVSANGER. Første iagttagelser: 16/4 1 Kl. (KF), 18/4 1-2 Kl. (VV). Ult. april indtil 6 Kl., derefter hurtigt stigende antal. Med. og ult. maj ca. 90 syngende Kl., hvortil kommer 3 Afl. og 3 Kls.

GRANSANGER. Første iagttagelser: 16/4 1 Kl. (KF), 17/4 1 Kl. (VV). Med. og ult. april 2 syngende Kl., pr. og med. maj 4 syngende Kl. og ult. maj - juni 3 syngende Kl., hvortil kommer: 19/4 1 Afl. (VV).

SKOVSANGER. Første iagttagelser sene: 7/5 10 Kl. (SKR), 8/5 5 Kl. (VV). Maj - juni indtil 22 syngende Kl.

FUGLEKONGE. Kun enkelte overvintrende. Trækkoncentration i april, flest 11/4 150 Kl. (SKR). Maj - juni 5-10 syngende Kl.

RØDTOPPET FUGLEKONGE. Følgende observationer: 9/5 1 han Kl. (RTA,SJ,JEL,SAL,LF), 10/5 2 hanner Kl. (KD).

GRÅ FLUESNAPPER. Første iagttagelser: 8/5 1 Kl. (MBK), 10/5 1 Kl. (VV). Usædvanlig få iagttagelser, maj - juni således kun registreret i antal på indtil 4 Kl.

BROGET FLUESNAPPER. Første iagttagelser: 6/5 8 Kl. (SJ,VV), 7/5 12 M.Kl. (MBK,SKR). I øvrigt kun set i beskedent antal. 1 han truffet konstant Kl. til udgangen af maj.

LILLE FLUESNAPPER. 2 iagttagelser: 23/5 1 hun/juv. Kl. (HPJ,BBP), 30/5 1 ad. han Kl. (BBP).

JERNSPURV. Jan. - med. marts kun følgende rapporteret: 6/1 1 Afl. (SC), 29/2 1 Afl. (SKR), 11/3 1 Afl. (VV). Ult. marts - med. april langsomt stigende antal. Maj oftest 30-40 syngende Kl. Hertil kommer endvidere bl. a. 2 Afl. 3-4 Kls.

ENGPIBER. Jan. - med. marts sædvanligvis 5-15 Afl.Kls., lejlighedsvis flere, således 6/1 30 Afl. (SC), 15/1 27 Kls. (MBK), 17/1 33 Kls. (RTA,LN), 14/3 20 Afl. (VV). Ult. marts - april oftest 10-20 Afl. 15-30 Kls. Større rastantal pr. maj: 1/5 30 Afl. 50 Kls. (SKR). Maj - juni 5-10 Afl. 10-15 Kls. syngende. Ringe træk ult. marts - pr. maj, flest 1/5 94 Afl.Kls. (SKR).

SKOVPIBER. Første iagttagelser: 1/5 2 trk. Afl. 2 trk. Kls. (SKR,VV), 6/5 3-4 Kl. (SJ,VV). Enkelte trækiagttagelser pr. og med. maj. Maj truffet syngende 3 steder Kl.

SKARPIBER. En enkelt jan.-iagttagelse: 4/1 1 Kls. (MBK). Marts - med. april regelmæssigt 1-4 Afl. 1-5 Kls., ved en enkelt lejlighed flere: 3/4 3 Afl. 7 Kls. (EM,SKR). Seneste iagttagelse: 14/4 1 trk. Kls. (SKR).

HVID VIPSTJERT. Første iagttagelser ret sene: 27/3 1 Kls. (HPJ), 28/3 1 trk. Kls. (SKR). Beskedent træk med kulmination med. april. Som sædvanlig kun få rst.: april - juni 1-2 Afl. 1-4 Kls., undtagelsesvis lidt flere, maks. 3/4 7 Afl. 2 Kls. (SC,SKR,VV), 11/4 7 Kls. (SKR), 12/4 8 Afl.Kls. (VV).

BJERGVIPSTJERT. Kun en enkelt iagttagelse: 20/3 1 han trk. N. Kls. (RTA).

GUL VIPSTJERT. Første iagttagelse usandsynlig tidlig: 12/4 1 Kls. (MBK), næste ret sen: 29/4 1 han Afl. (SC). Med. maj indtil 35 registreret Afl.Kls. Ult. maj - juni regelmæssigt 12 Afl. 14-18 Kls. Umærkbart træk. Følgende iagttagelser af den nordlige race: 8/5 1 Kls. (VV) og så sent som 14/6 2 Afl. (SC).

SILKEHALE. Beskeden forekomst: 6/2 20 Afl. (SC), 22/2 18 Afl. (SC).

STOR TORNSKADE. 3 set regelmæssigt jan. - med. marts Kl.Kls.M. Sidste iagttagelser: 20/3 1 Kls. (JEL,JHL,SAL,EM), 27/3 1 Kl. (SJ).

RØDRYGGET TORNSKADE. Første iagttagelser: 13/5 1 han Kl. (VV), 14/5 1 han 1 hun Kl. (KF,VV). Med. maj - juni truffet 9 forskellige steder i området.

STÆR. Kun én iagttagelse fra perioden jan. - med. febr.: 4/2 5 Afl. (SC). Følgende iagttagelse fra ult. febr.: 26/2 30 Afl. (SC,VV), derefter regelmæssigt med antal stigende fra 10-20 pr. og med. marts til 100-300 ult. marts - maj, undtagelsesvis flere, således: 26/3 400 Afl. (SC), 28/3 500 Kls. (RTA), 2/4 500 Afl. (VV), 3/4 1000 Afl. (SKR,VV). Juni indtil 350. Trækiagttagelser fra perioden ult. febr. - med. april: i alt 1328, kulmination ult. marts - pr. april. Melleltræk med. og ult. juni, indledt 18/6 160 trk. Afl. (SC).

KARNEBIDER. Jan. - febr. ofte 1-2 iagttaget Kl.Kls. og 28/2 min. 7 Kl. (RTA). Marts - april regelmæssige iagttagelser Kl. af indtil 10. Maj - juni ca. 30 Kl.

GRØNIRISK. Jan. 20-60 Afl.Kls., febr. - juni indtil 20, hyppigst under 10 Afl.Kl.Kls. Sparsomt træk marts - april, flest 2/4 160 Afl. (SC).

STILLITS. Jan. - april jævnlige iagttagelser af 1-4 rst. Afl.Kl.Kls., lejlighedsvis indtil 8. Desuden: 18/1 22 Kl. (RTA,MBK,LN), 20/3 34 Kl. (RTA), hvortil kommer én trækiagttagelse: 30/4 28 Afl. (SC). Maj - juni 7-12 syngende Kl.

TORNIRISK. En iagttagelse fra pr. jan.: 4/1 1 Kls. (JEL,JHL), i øvrigt ingen iagttagelser før ult. marts, hvorfra følgende foreligger: 27/3 2 M. (LN), 28/3 1 rst. Kls. (LN) 11 trk. Afl.Kls. (SC,SKR,VV). April - juni regelmæssigt indtil 20 rst., lejlighedsvis flere: 4/4 50 (RTA), 22/5 30 Afl. (SKR). Beskedent træk registreret ult. marts - pr. maj.

GRØNSISKEN. Bortset fra 6/1 12 Kl. (FJH), 10/1 25 Kl. (RTA), 22/2 25 Kls. (SKR), 17/4 15 Kl. (VV) kun spredte iagttagelser af indtil 10 i perioden jan. - pr. maj, Sidste iagttagelse: 9/5 1 Kl. (RTA).

BJERGIRISK. Alle forårets iagttagelser skal nævnes: 2/1 13 Kls. (FJH), 4/1 24 Kls. (MBK, JEL, JHL, SAL, LN), 9/1 2 Afl. (SC), 10/1 8 Kls. (RTA, MBK, FJH, LN), 17/1 5 Kls. (RTA, LN), 18/1 14 Kls. (MBK, RTA, EM, SKR), 25/1 1 Kl. (JEL, SAL), 3/2 12 Afl. (SC), 15/2 35 Kls. (LN), 4/4 3 Afl. (JLP), 8/4 10 trk. Afl.Kls. (SC, SKR), 10/4 2 trk. Kls. (SKR), 13/4 2 Afl. (SC), 14/4 1 trk. Afl. (SKR, VV).

GRØSISKEN. Efterdønningerne fra efterårets mindre invasion har givet sig udslag i følgende observationer: 1/1 21 Kl. (BKA, EVR), 2/1 25 Kl.Kls. (JBB, SJ, EM, KMO), 4/1 10 Kls. (EM, EVR), 10/1 10 rst. Kls. (LNA, FJH, LN, EM, EVR, SKR, VV) 29 trk. Kls. (RTA, FJH), 17/1 16 Kls. (RTA, LN) 21 Kl. (SJ), 18/1 2 Kl. (LN, BBP), 24/1 6 Kls. (SKR), 15/2 9 M. (LN).

Følgende 2 rapporteret: 1/1 1 Kl. (BKA), 22/2 1 Kl. (SJ, LN).

GULIRISK. Færre iagttagelser end i foråret 1975. Første iagttagelse: 1/5 1 hann syngende Kl. (RTA, JEL, JHL, EM, SKR, VV). Maj - juni i øvrigt regelmæssige iagttagelser af 1 han 1 hun i Kl.'s sydøstlige del (LNA, RTA, KD, KF, HPJ, SJ, MBK, JEL, JHL, SAL, EM, LN, BBP, SKR, VT, VV), hvortil yderligere kommer: 5/5 3 trækforsøg Kls. (JBB), 7/5 1 han Kl. (MBK), 8/5 1 han Kls. (VV), 9/5 2 hanner Kl. (MBK, LP), 17/5 1 han M. (LN), 23/5 1 han M. (LN), 8/6 1 trækforsøg Kls. (JBB), 19/6 1 han afl. (JLP, SKR), 24/6 1 han M. (LN), d.v.s. mindst 3 ekstra - muligvis omskuffende hanner.

BONPAP. Kun meget beskedent antal jan. - med. april, således maksimalt 11/1 8 Kl. (SKR). Maj - juni 1-2 par Kl. (SKR, VV).

LILLE KORSNÆB. Samtlige iagttagelser: 6/3 1 hun Kl. (SJ, LN), 22/5 4 Kl. (RTA), 4/6 3 Kl. (LN), 5/6 4 Kl. (SAL, LN, EM), 26/6 hørt Kl. (JEL, JHL, SAL), hvortil kan føjes følgende ubestemte korsnæb: 15/2 1 Kl. (LN), 18/4 1 Kl. (VV).

BOGFİNKE. Næsten ingen i området jan. - febr. Fra april foreligger iagttagelser af større flokke: 3/4 1000 M.Kls. (HPJ, SKR), 4/4 200 Kls. (SKR). Sparsomt træk ult. marts - pr. maj, flest 1/4 407 Afl. (SC), 2/4 13485 Afl. (SC), 3/4 225 Kls. (SKR). Som sædvanlig talrig i Kl. i maj - juni, dog synes antallet at være lavere end for en halv snes år siden.

KVÆKERFINKE. Uhyre beskedent antal registreret regelmæssigt i perioden jan. - pr. maj, herefter følgende observationer: 14/5 1 han Kl. (VV), 15/5 1 han Kl. (JEL, JHL, SAL), 27/5 1 han Kl. (SKR), 29/5 1 han Kl. (SAL), 26/6 1 han Kl. (JEL, JHL, SAL).

HVIDSTRUBET SPURV, (Zonotrichia albicollis). 23/5 1 ad. Kl. (KF, SKR, VV). Dette er første iagttagelse i Danmark af denne art, der yngler i Canada og det nordøstlige U.S.A. Arten træffes som en tilfældig gæst i Europa, hvor den siden 1965 ses næsten årlig i Storbritannien/Irland. Beskrivelse er tilsendt SU.

GULSPURV. Jan. - pr. april regelmæssige observationer af indtil 15, dog 1/1 18 Kl. (FJH). Fra med. april regelmæssig Kl. og maj - juni 18-19 syngende Kl., hvilket er lidt færre end i topåret 1975.

HORTULAN. 3 iagttagelser: 6/5 7 M. (SJ, VV), 8/5 1 han Kls. (MBK), 9/5 1 han M. (RTA, HPJ, SJ, JEL, SAL).

RØRSPURV. Jan. - febr. regelmæssigt 3-4 Afl. 1 Kls., marts - april indtil 20 Afl.Kls. Maj - juni syngende 6 Afl. 9 Kls., hvilket er en del færre end i 1975. Ringe træk ult. marts - pr. maj, flest 2/4 261 trk. Afl. (SC).

LAPLANDSVÆRLING. 22/2 1 Kls. (KMO), hvilket er alt.

SNESPURV. Jan. ofte 5-8 fortrinsvis Afl., dog flere: 2/1 14 Afl. (SC) 10 Kls. (FJH), 9/1 30 Afl. (SC), 14/1 30 Afl. (SC). Febr. - pr. april hyppigt 1-5, dog indtil 8 Afl.Kls. Trækiagtt.: 2/4 40 Afl. (VV). Sidste: 5/4 6 Afl. (SC).

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.